

子癲前症會造成什麼影響？

子癲前症對媽媽及寶寶都可能產生不良影響：

對寶寶

- 胎盤血流不足，影響氧氣供應
- 生長受限遲緩
- 增加早產風險
- 增加胎盤早期剝離的風險，引起胎兒子宮內缺氧或死亡



對媽媽

- 血壓持續升高
- 可能發生胎盤早期剝離
- 嚴重時可能出現抽搐（子癲症）
- 可能併發中風或腦出血等嚴重狀況



*註：子癲前症若出現抽搐，即為子癲症



衛生福利部

委辦單位



財團法人
台灣婦女健康暨泌尿基金會
The Foundation for Women's Health and Urogynecology of Taiwan

認識子癲前症

守護媽咪與寶寶 的平安旅程



子癲前症是什麼？

子癲前症（Preeclampsia）是妊娠期間血壓升高的併發症，可能影響媽媽與寶寶的健康，通常發生在懷孕20週之後，也可能在產後發生，每100位孕婦中，有約2～8位可能發生。

子癲前症嚴重時，可能會引發胎盤早期剝離、抽搐、中風或腦出血等，最嚴重可能會危及生命危險。因此，認識及預防子癲前症，是降低顱內出血風險、守護媽媽安全的重要關鍵。

子癲前症初期常常沒有明顯不舒服，透過及早發現、適當監測與治療，大多可以安心度過孕期。

主要特徵為

血壓升高（ $\geq 140/90$ mmHg）

並可能合併

- 尿液中出現蛋白
- 血小板下降
- 肝功能或腎功能異常
- 呼吸困難（可能為肺水腫症狀）
- 持續性頭痛或視覺異常